

# Traumata – 3 Fallbeispiele

## Fallbeispiel 1

„Eine 17-jährige Patientin hatte ihren Vater gefunden, der sich durch Erhängen suizidiert hatte. Die Gedanken an den Vater tauchten immer wieder vor dem Einschlafen auf und führten dazu, dass die Patientin die Zeit des Zubettgehens bis in die tiefe Nacht verschob“.

Fallbeispiele aus: Entwicklungspsychiatrie, Schattauer, 2008, S. 973

## Fallbeispiel 2

„Eine 16-jährige Patientin war über viele Jahre wiederholt von ihrem Vater sexuell missbraucht worden. Geringfügige Ereignisse oder auch Gegenstände lösten ein dissoziatives Erleben aus, bei dem die Patientin wieder mit dem missbrauchenden Vater konfrontiert war. Die dissoziativen Zustände endeten regelmäßig mit selbstverletzenden Verhaltensweisen“.

## Fallbeispiel 3

„Ein Mädchen, das mit seinen drei Geschwistern dem Mord an der Mutter durch den Vater beigewohnt hatte, zeichnete im Rahmen des projektiven Testverfahrens „Familie in Tieren“ auch nach viele Wochen nach dem Tod der Mutter eine vollständige Familie, in der die Mutter weiterhin anwesend war“.